

통/증/ 관/리/ 솔/루/션/

베스타캠-주



문제는 **통증**, 방치하지 마세요.
베스타캠-주로 수익을 관리하세요!!!

MMA(유방염, 자궁내막염, 무유증 복합증후군)의 예방

비감염성 보행장애 치료

호흡기 질병 시 임상증상 완화

모든 당 4~5mL로
적은 주사 용량



통증을 관리하지 않고 방치하면 이유자돈의 증체량이 6.8%가 하락합니다.¹⁾


통증관리를 할 경우 초유의 모체이행항체가 증가하며, 폐사율 1.8% 감소합니다.¹⁾

통증관리를 전혀 하지 않은 농장과 통증관리를 하는 농장의 수익 차이를 느껴보세요.

돼지 휴약기간 5일

1) Eva Mainau etc, Pharmacological pain management in sows(FAWEC, 2017), 24-26p


멜록시카 1일 1회 주사로 신속한 치료 효과 기대



- 통증을 관리하는 돼지가 잘 먹고 충분한 휴식을 취할 수 있습니다.
- 통증을 관리하는 모돈은 **항체가(IgG 함량) 높은 초유**를 생산합니다.
- 보행장애를 겪고 있는 돼지에게 통증을 관리하면 **활동성이 높아지고 사료 섭취가 개선**됩니다.

Paris-Garcia, Monique Danielle, "Advancing techniques to promote the welfare of sows utilized in laboratory based lameness models" (2014). Graduate Theses and Dissertations. 13756.

수의사들이 멜록시카제제를 가장 많이 선호하는 이유는?



- 가격 대비 **우수한 효능**
- 다른 NSAID(비스테로이드성 항염증제)에 비해 **위장관 궤양유발 가능성이 낮음**
- 상대적으로 **짧은 휴약기간(돼지 5일)**

많은 의사들이 선호하는 멜록시카 제제의 효능 이제 『**베스타카-주**』로 먼저 경험하세요.

원료약품 및 분량 [본제 1mL 중] 멜록시카: 20mg

용법 및 용량

- 가. 소 - 급성 호흡기 감염 : 항생제 처리와 더불어 체중 100kg당 2.5mL를 피하 또는 정맥을 통해 1회 접종
 - 설사 : 경구를 통한 재수화 요법과 병행하여 체중 100kg당 2.5mL를 피하 또는 정맥을 통해 1회 접종
 - 급성유방염 : 항생제 처리와 더불어 체중 100kg당 2.5mL를 피하 또는 정맥을 통해 1회 접종

나. 돼지 : 항생제 처리와 병행하여 체중 100kg당 2.0mL를 근육주사하고 필요하면 24시간 이후 한 번 더 주사
휴약기간 소 15일, 우유 5일, 돼지 5일



녹십자수의약품
GREEN CROSS VETERINARY PRODUCTS